

## 高壓氧治療之禁忌症

### 試 題

- ( ) 1. 高壓氧治療的潛在危險包括：
- A. 氣壓改變。
  - B. 呼吸高壓氧。
  - C. 高壓艙的特殊環境。
  - D. 以上皆是。
- ( ) 2. 高壓氧治療的絕對禁忌症包括：
- A. 未經治療的氣胸。
  - B. 急性嚴重氣管痙攣。
  - C. 同時使用 Doxorubicin 治療。
  - D. 同時或最近使用 Bleomycin。
  - E. 以上皆是。
- ( ) 3. 高壓氧治療的相對禁忌症包括：
- A. 上呼吸道感染。
  - B. 胸部 X 光片出現無症狀之空氣囊腫或氣泡。
  - C. 氣胸或胸部手術病史。
  - D. 病患危險行為。
  - E. 以上皆是。
- ( ) 4. 下列何者是增加中樞神經系統氧氣中毒最有影響力的因素：
- A. 年齡。
  - B. 性別。
  - C. 生理周期。
  - D. 體溫。
  - E. 二氧化碳濃度。
- ( ) 5. 減少高壓氧治療風險的主要措施包括：
- A. 初步的醫師會診。
  - B. 病患的衛教。
  - C. 高壓艙操作技術員的照護與監控。
  - D. 以上皆是。