

高壓氧於小兒外科之病例報告及文獻探討

試 題 單

會員編號： _____

姓名： _____

- () 1. 新生兒使用高壓氧艙治療需注意哪些併發症：
- A. 肺中毒
 - B. 中樞神經系統中毒
 - C. 視網膜病變
 - D. 以上皆是
- () 2. 高壓氧治療對化膿性腹膜炎術後病人有利因素是：
- A. 較大壓力，純氧濃度，讓更多的氧氣溶解到細胞外液
 - B. 到達更深組織，增強白血球、淋巴球吞噬細菌病毒
 - C. 更容易和更持續高於以往任何時候，同時亦可增強抗生素作用，降低炎症發生。
 - D. 以上皆是
- () 3. 操作病兒高壓氧治療加壓速度必須遵守項目，哪一項目為非：
- A. 嚴格遵守加壓一公尺一分鐘原則
 - B. 在加壓過程有不適狀況大都是因中耳或鼻竇問題引起。所以必須在加壓時 1.25、1.5、1.75大氣壓短暫暫停加壓
 - C. 緩慢加壓以每分鐘1.5公尺速度可以減少不適情形發生。
 - D. 整個加壓過程需密切注意監視器以觀察病兒在艙內任何狀況。
- () 4. 病兒作高壓氧治療據血流循環儀器監測治療壓力有義意的治療壓力為：
- A. 2.0至2.5大氣壓
 - B. 1.5至1.75大氣壓
 - C. 1.75至2.0大氣壓
 - D. 1.8至2.3大氣壓
- () 5. 停留在高壓艙病兒治療時間最佳為
- A. 40-60分鐘為限
 - B. 80-90分鐘為限
 - C. 90-120分鐘為限
 - D. 120-180分鐘為限

